

幼  
幼  
新  
書

幼幼新書卷第二十七

吐噦霍亂

凡十二門

後學古吳陳履端于始輯

爛溪周應愿公謹校

吐逆第一

巢氏兒啼不定氣息不調母遽乳之氣尚逆乳不下  
停滯胃膈則胃滿氣急令嘔逆變吐又乳母將息取  
冷冷入乳而壞不捏除之仍飲兒冷與胃逆則腹脹  
痛氣息喘急亦令嘔吐又解換衣裳及浴露體不避  
風冷客膚腠搏氣血則熱入胃亦腹脹痛而嘔逆吐

也唯冷乳非直嘔吐腸虛入大腸則為痢

藻東王先生兒吐乳有數般或風疾致吐勿止吐妳  
夾痰纔吐即風生若止之風無止處更入外風則潮  
心閉胃管變驚風胃主四肢被痰涎閉即搐心主神  
被外邪干即驚神不定故變驚風是止住吐手足搐  
搦口眼翻張頭項強直名藥不療

兒吐妳鼻青客風外傷肺鼻肺外應也夜煩躁肺氣  
逆也身發熱肺主皮毛外邪傷故發熱也宜傷寒藥  
後平胃氣

兒吐妳唇黑多笑唇脾外應被食傷故黑夾痰者脾能生涎故痰衝胃而吐

兒吐妳身熱妳成片胃有熱積久則生風必四肢發瘡多渴面黃

兒吐妳不化夾清水胃冷必面青唇白宜煖胃

兒吐妳早晚發熱是驚吐而不睡宜調驚

乳食不化腹急氣逆須塌氣丸二三服下却胃膈進

觀音散二三服和胃氣不但生胃氣藥皆可意與兒喫

冷乳氣逆肚疼或變瀉前藥調理不退用羌活膏

錢乙吐乳瀉黃傷熱乳也吐乳瀉青傷冷乳也悉宜下

患眼兒無故吐乳因乳母冷熱不調啼中餵乳致胃  
膈逆舊乳不化故多吐妳辨或帶酸氣謂妳積急用  
牛黃丸風熱仍服勻氣平胃湯藥若胃脾虛滑喫食  
多吐只服平胃丸嘔逆夾蘆會丸未見若正二月間以

鮓湯丸利

急慢驚

小方論熱甚而吐更服熱藥脾胃熱而胃口閉故吐  
水穀不通凡湯藥乳食只伏在胃管胃膈不上不下

為結腸翻吐歌曰

得患初因是熱傷熱極吐逆也尋常醫人不曾  
看形候又服熱藥怎生當至令胃閉并脹結莫  
服冷藥不須涼若還更取兒當死先須開胃後  
通腸

寶鑑歌

風冷吹雙乳乳壞氣須凝乳兒成嘔吐氣喘腹  
膨脹解脫當風下洗浴向簷前喘中還餵乳氣  
逆在胃停皆成嘔逆病醫者貴調停

石壁歌

吐乳從來胃氣實、妳滿胃中生吐逆、吐多遍身  
有風生、驚邪本是從斯得、吐定無過腦後溫、吐  
出妳來無變色、先與定氣後除驚、此是醫良不  
費力、

兒胃氣實、乳母或氣不定、或交妳、或怒未息、或行  
房了、便乳使、劃時便吐、妳不變色、無害、若色青黃、  
或如水、或中有虫、須涼膈、以溫物暖腦後、避惡風、  
吹風府、既生其氣、又涼上焦、即止、

形證論吐乳青色者驚黃色者風熱有涎者驚妳乳  
鮮者傷乳成塊者胃冷

本草蘆節中虫如小蚕二枚煮汁飲

千金治吐妳補虛止渴牛乳入薑葱白煎量服

廣利刪木皮水煎服生廣南如桑株

聖惠丁香散治嘔吐不定

丁香

人參

白茯苓

木香

葛根

甘草炙

枇杷葉

去毛炙各一升

麝半分



細羅不時薑湯調半錢意裁

丁香散治嘔吐心煩不納乳

丁香

人參

茅根

麥門冬

甘草炙

陳皮去白焙各一分

粗羅一錢水小盞煎五令稍熱服量頻與

人參散

人參

白朮

乾薑炮

半夏

炮七次炒

桑白皮

陳皮去白焙各半兩

粗羅一錢水小盞薑棗煎五令服

張渙無乾薑名白米湯

治兒吐乳乳母服

人參

一两

薑

焙

陳皮

去白焙各半两

篩三錢水中盞煎六分溫二服了乳兒

治吐乳黃色驢乳喫大腸稍利毒氣散

又搗韭根汁灌入口差

醫局療傳尸骨蒸癰疽肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂

吐痢時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘕血月閉痲痺丁腫

驚癇鬼忤中人兒吐乳大人狐狸等蘇合香丸

蘇合香油

入安息香膏

薰陸香

龍腦

各一两

朱砂飛

白朮

丁香

青木香

白檀香

沉香

烏犀

華攢

安息香

未澄去沙無灰  
酒一斗熬膏

香附

訶梨勒皮

麝

各二兩

末安息香膏煉蜜和旋丸如桐子并華水溫冷任意化服四九老小一九溫酒亦得並空心服蠟紙裹一九如彈緋絹袋盛當心帶一切邪神不敢近消積滯生冷留飲宿食止痰逆惡心霍亂嘔吐治心腹脹悶脅肋刺痛胃膈痞滿噎塞不通常服順脾胃

進飲食兒吐逆不定小丁香丸

丁香

三兩

肉豆蔻

卅個

五靈脂

十二兩

木香

兩半

巴豆霜

二百粒

細末麪糊丸如黍服五七丸溫薑湯下陳皮湯亦得食後霍亂吐逆桃葉湯冷下兒吐逆三歲三九量加生薑桃葉湯下

殊聖方

乾薑炭火燒及八分研冷蜜湯調一字至半錢

嬰孺治吐下不止王子湯

刀刀斤書

卷三十七

下

赤石脂九銖

黃連

甘草炙

乾薑各六銖

黃芩二銖

膠指大

黃蠟彈大

水三升煮一升內蠟膠洋為三服意裁

漢東王先生羌活膏治吐逆不止

羌活

獨活

人參

白茯苓

防風蚕頭者

肉桂不見火

全蝎炒

水銀各一兩

硫黃同水銀研星盡三錢

末蜜為膏旋與嬰兒黑豆大二三歲龍眼核大量

加薄苛湯化

張漢香參湯消寒痰治嘔吐

藿香葉

人參

舶上丁香皮白茯苓

丁香

各一兩

青皮

去白

木香

甘草

炙各半兩

羅末一錢水小盞薑二片煎五分溫服

溫腸湯勻氣治嘔吐

丁香

單豆蔻

去皮

人參

各半兩

青皮

檳榔

甘草

炙各一兩

羅末半錢至一錢薑汁少許溫湯調下

香朴散調冷熱治嘔吐

丁香

麥門冬

各半兩

厚朴

炙

人參

細末一錢水小盞薑二片棗一枚煎五分溫服

香葛湯治嘔吐後渴甚津液少

藿香

白茯苓

甘草

炙各半兩

丁香

乾葛

人參

各一兩

羅麝一錢研服半錢至一錢薑湯調意裁

寶鑑治只吐不瀉腹中疼痛玉露散

寒水石燒薑水調半錢

衛生療吐逆革金散

爛大梔子三枚草烏頭一個

小瓶盛泥固燒煙盡研細薑汁調一字

寶童治翻胃吐逆腹內虛鳴

天台烏藥醋炙或炒

半夏各半兩

白薑一分

羊屎十枚腹內取

文武火炒末鎔蠟丸如麻子紅酒服五七丸

劉氏異攻散治胃氣不和藏府泄瀉不思乳食或嘔

妳嘔逆

藿香

白朮炒

人參

白茯苓



陳皮

木香

肉苳蔻

煨麩裏

甘草

等分服小半錢紫蘇餅飲調

莊氏鎮驚化痰祛風止嗽定逆除一切驚積蝎梢丸

蝎梢

炒

半夏

洗七次

丁香

棟炒

朱砂

白附子

炮裂各一

末薑汁麩糊丸萊菔大服十九至十五丸不時薑

湯下

治吐衄

蓮子心

七個

丁香

三個

人參

末綿裹乳汁浸令兒吮

孔氏治兒吐胃虛生風胃氣欲脫醒脾散

人參

天南星

末旋抄服二味各半錢冬瓜子三七粒水盞半煎  
兩茶脚許通口服不時胃氣生為度大人倍煎

王氏治久吐玉壺丸

半夏

白麪

各一兩

大天南星

一個

天麻

半兩

末薑汁化柳膠丸黃米大漿水煮四沸服十九十

五丸如無柳枝湯

吉氏豆蔻散治吐痢

肉豆蔻

煨麩

草薢子

炮各一枚

宿砂

甘草

炙

肉桂

不見火各一錢

陳皮

去白半錢

末半錢陳米飲調下

李劉中

川當歸

洗

甘草

炙各一分

桂心

不見火去粗皮

枳殼

炒

北五味子

各半兩

細末一錢水七分煎半瓊溫服

丁時發肉豆蔻散治脾胃不和寒熱腹痛嘔吐不食

白豆蔻

肉豆蔻

甘草炙

芎

陳皮

去白

枳殼

去毛各一分

黃耆炙

乾木瓜

人參

各半兩

末一錢水五分薑棗煎三分服

鄭愈治吐逆藿香散次加人參陳皮枳殼去藿香麴

藿香

赤麴

各二錢

半夏

薑製一錢

末半錢南木香湯或木瓜湯下三服

聖惠灸中庭一穴一壯在顛中下一寸陷中如麥粒

寶鑑灸上管中管各三壯

吐乳第二

巢氏兒哺乳冷熱不調則停胃膈更新乳哺前後相觸氣不宣流故吐乳脉輕浮者無咎

本草乳乳飽後乳出與吐逆不同

茅先生兒吐乳候吃妳不穩從口角自流出身微熱

口鼻微冷面目青黃眼慢因乳女房室滯洩兒叫便

乳陰陽不順胃膈不快乳停胃不消而胃冷所致先

以睡驚沉香飲子霍亂夾丁香散與眼吐利夾活脾

散調理愈一胃氣不和門恐脾虛受熱狂躁不睡眼

慢脾風門

偏微喘傳慢脾風不治

石壁歌

顛陷時時動不停吐中微覺乳生腥眼渾青碧  
生白膜汗出津津脚似冰氣細元因傷胃冷氣  
粗即是欲生驚是風從早宜醫療煖胃和脾氣  
乃平

寒熱相勝使然氣急是胃實當涼則愈若顛門陷  
下氣細當生胃氣若渾身熱甚目中白膜甚者氣  
出喘粗不急治必作癰癰

鳳髓氣散宜地黃散

霍亂吐利

氣粗宜葱湯丸取

驚積

形證論此驚妳衝胃氣或交妳衝脾或氣妳或病妳致吐遠聞腥氣與蚘蚋丸一切氣細脉沉與調胃散

積熱

肘後治嘔嘔吐下

甘草

炙

人參

當歸

乾薑

各一分

末水一升煮五合分服日三內麝半分佳

嬰孺當歸湯治吐嘔

當歸

黃芩

甘草

芩

黃連

各一

細辛

乾薑

各二

切水二升煮八合溫服半合日三

寶鑑治嘔乳玉真散

白朮

兩半

半夏

七個

枳

半斤去目汗

細末半字水一呷調下一字

噦逆第三

巢氏兒哺乳冷冷氣入胃與胃氣逆故噦

千金翼胃中虛冷不能食者飲水即噦

千金治兒噦



薑汁

牛乳

各五合煎五合分二服

聖惠治噦不止丁香散

丁香

藿香

白茅根

各

一

人參

兩半

花桑葉

羅散三四歲服一錢水小盞薑少許煎五分不時

熱服量裁

人參散治噦逆不止心神煩亂

人參

白朮

白茯苓

各

半

甘草

炙

藿香各一

粗羅一錢水小盞煎五分不時稍熱服量裁兼乳  
好服訖即乳兒

麥門冬散治多噦心胃煩悶

麥門冬淨焙甘草炙一人參

陳皮去白

厚朴薑炙各半兩

粗羅三四歲服一錢水小盞煎四分稍熱頻服更  
量

霍亂吐利第四

巢氏霍亂者陰陽清濁二氣相干氣亂腸胃間為霍  
亂兒腸胃嫩弱因解脫逢風冷乳哺不消而變吐利  
或乳母觸冒風冷食生冷物冷氣入乳令乳變敗兒  
飲之亦成霍亂吐利挾風而挾實者則身熱頭痛體  
疼而復吐利也兒霍亂須暫斷乳藥與乳母服令血  
氣調適乳汁溫和若不止血氣變亂即發驚癇  
千金翼嘔吐而痢為霍亂

漢東王先生嬰兒霍亂吐瀉往往變作慢脾慢驚宜  
竹瀝膏間惺惺散

並痢久不止門

調胃氣樂并沉香散

楊大鄴將息小兒之道擇乳母精神爽健精神詳慢  
智慧深遠身無疾病脂肉肥潤溫厚淳善能調理乳  
食何疾更生衆疾易愈緣不慎諸味如意恣餐孩兒  
或變蒸或瘵寒哺乳或蒸熱飼兒或醉後嗔怒或悲  
啼不常驚亂神氣乳食失常即吐瀉可疑

患眼忽然吐瀉為霍亂若狂躁夜不睡喘促死

玉訣霍亂有兩證若胃冷霍亂身無大熱只微溫面  
青黃宜銀白散調氣若腹痛多啼口吐清水面色不  
定乾噦不常宜蘆會丸殺虫

霍亂門

後調氣歌曰

霍亂皆因胃氣傷冷熱攻脾氣受殃或積或虫  
寒與熱胃虛乾嘔不尋常

### 石壁經歌

先以青黃面色看定因風熱在脾間髮如直立  
人多怕開眼無休定有涎胃逆更看風熱搐常  
疑唇白口多乾舌若有瘡為熱極難過二七入

### 黃泉

青白滿面者冷痰在胃間主吐瀉若黃赤胃有熱  
積亦主霍亂此胃虛實看候調治失治則口乾燥

煩渴若搖擗逆候口中瘡如雞子白滿口者不治  
千金治霍亂吐利

人參

一兩

厚朴

薑製

甘草

炙各半兩

白朮

炮炙十銖

呖咀水升二合煮半升二月兒服一合更量乳母  
忌生冷油膩一加乾薑一分或生薑三分

聖惠半夏散治霍亂後吐瀉不止煩悶

半夏

湯洗七次

黃連

乾薑

炮

陳皮

焙去白

人參

當歸

炒各半兩

黃芩

甘草

炙各一分

粗羅服一錢水小盞煎五分不時量服

治霍亂吐瀉不定丁香散

丁香

木香

甘草炙

葛根

枇杷葉

拭毛炙各半分

藿香

人參

桑黃

各半兩

細羅不時麝香湯調半錢量服

治霍亂吐瀉不止食飲不下肉豆蔻散

肉豆蔻

一枚

丁香

枇杷葉

去毛炙

黃耆

各半

桂心

人參

白茯苓

甘草

炙各半兩

陳皮

去白焙一分

散一歲溫酒調半錢三歲加服

漢東王先生七寶散治霍亂吐瀉不食

木香炮

丁香炒

官桂不見火

茯苓

麻黃去節

當歸

甘草炙

人參

大腹皮

訶子

川練子去核二味

秦艽炒各一錢

地榆炒二錢

肉豆蔻炮一錢

藿香炒半錢

末嬰孺一字三歲半錢四五歲一錢水半盞入棗

半片煎十沸溫服

沉香散補虛調胃定霍亂治吐瀉進飲食



沉香

茯苓

各一

甘草

炙

丁香

炒

藿香

錢各一

木香

炮

官桂

不見火  
各半錢

末嬰孺一字二三歲半錢五七歲一錢量裁紫蘇

木瓜湯調下日三

張漢順正湯順陰陽治霍亂吐利

白豆蔻

高良薑

炮

藿香

當歸

洗

草豆蔻

煨

陳皮

去白焙  
各半兩

丁香

一兩

細末半錢至一錢溫粥飲調下

香連散不清濁定霍亂吐利

木香

黃連

各一兩

厚朴

薑炙

人參

各半兩

細末一錢粟米飲調下

寶鑑藿香散治霍亂吐瀉

藿香

香薷

各一分

白茯苓

研半錢薑湯下如人行五里再進連三服

霍亂第五

吐或吐而不利或利而不吐或止霍亂而不吐利

本草主惡氣霍亂梳飲垢水和服

肘後治霍亂

人參

蘆薈

各二分

扁豆藤

二兩

倉米

二撮

吹咀水二升煮五合分五服效

千金止參  
宋多木瓜

劉氏療霍亂空吐不利

人參

分六

生薑

分四

厚朴

分二

陳皮

分一

兔骨

灸一  
兩

切水升二合煎四合服即利又以杏仁鹽阜角末

少許麴和硬搜如棗核綿裹內之便通妳毋忌熱

麴

療霍亂利而不吐

烏牛蒨草

一團  
舒移切

生薑

人參

各三  
兩

切甜不醋漿水升半煎五合分服如渴取曲蘗煮  
爛龍骨一兩煎澄清喫差

療霍亂不吐不利肚脹妨滿上下不通

甘草

炙四

當歸仁

石鹽

三分

切漿水升半煎六合半牛黃麝各半錢研蜜半匙  
和灌即通乳母喫漿水粥忌麪肉等

療乾霍亂渴熱壯熱眼色慢四大困悶

烏豆二升薑一兩水三升煎烏豆皮欲爛即濾汁  
二合和少許蜜喫即變吐人行六七里又呷大小

並宜

療熱霍亂諸藥不差

蘆葉二兩糯米三合水三升先煮取一升入蜜少  
許和服桑葉薑白米為飲亦效

聖惠麥門冬散治霍亂不下乳

麥門冬

兩一

白茯苓

人參

陳皮

去白

乾木瓜

各一

厚朴

薑炙

茅香

各半

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時溫服

嬰孺半夏湯治心結堅實飲不下嘔逆欲死并霍亂

後吐下不止短氣煩滿

半夏

分四

黃苓

甘草

各二分

乾薑

陳皮

當歸

人參

各三分

水四升煮升半二百日兒服三合若腹痛加當歸

三分嘔逆甚加陳皮三分

玉訣銀白散取積虫後生胃氣使不霍亂

人參

茯苓

甘草

炙

白朮

炒

白扁豆

皮去

等分末一錢紫蘇湯調一有藿香

惠眼香參膏治霍亂瀉住吐不住

人參一指

丁香粒十四

藿香錢一

糯米粒七十

丁香炒黃

未棗肉和膏服一指大鹽薑湯下

吐利第六但吐利而不霍亂

巢氏兒解脫風冷入腸胃腸胃虛則泄利胃氣逆則

嘔吐大體與霍亂相似而少輕不劇悶頓故直云吐

利

錢乙兒初生三日吐瀉壯熱不思乳食大便不化或

色白是傷食用白餅子下後益黃散和胃和胃氣不

兒生三日至十日吐瀉身溫涼不思乳食大便青白乳食不消此上實下虛也更兼見證肺主晝露睛喘氣心主驚悸飲水脾主困倦饒睡肝主呵欠頓悶腎主不語畏明當瀉兼葳補脾益黃散此多得于秋夏夏秋吐瀉五月廿五日後吐瀉身壯熱此熱也兒葳府十不中九不熱或因傷熱乳食吐乳不消瀉深黃色主玉露散六月十五日後吐瀉身溫似熱葳府六不熱四不冷吐嘔乳食不消瀉黃白色似渴或食或



不食食前少服益黃散食後多服玉露散七月七日  
後吐瀉身溫涼三分熱七分冷不能食乳多似睡悶  
亂哽氣長出氣睡露睛唇白多噦欲大便不渴食前  
多服益黃散食後少服玉露散八月十五後吐瀉止  
冷無陽也不能食乳乾噦瀉青褐水當補益黃散勿  
下、

論吐瀉廣親五太尉病吐瀉不止米穀不化六月中  
用薑汁調補藥一日加喘錢曰熱傷在內併石膏湯  
三服衆謂補脾用丁香散三服錢曰服此三日必腹

滿身熱飲水吐逆謂六月熱伏腹中也一如所言衆  
又行溫藥上焦亦熱喘而引飲三日當死衆不能治  
復召錢錢見熱證用白虎湯三服更以白餅子下之  
一日減藥二升二三日以白虎湯各一服四日用石  
膏湯一服旋合麥門冬腦子牛黃天竺黃茯苓為丸  
朱砂衣竹葉湯下五丸熱退安

一有黃苓

論虛實下藥馮承務子五歲吐瀉壯熱不思食錢曰  
此子必多病面晄白神怯也黑睛少腎虛也黑睛屬  
水本怯而虛縱長成必肌膚不壯不奈寒暑易虛易

實脾胃亦怯更勿縱酒慾若不保養不過壯年面無精神光澤如婦人失血今吐利不食壯熱者傷食也下之虛入肺則嗽入心則驚入脾則瀉入腎則益虛但以消積丸磨之如傷食甚則可下不下成癖實在內可下下畢補脾隨其虛實無不效

吐瀉問難廣親七大尉病吐瀉時七月證全不食而昏瞤睡覺而悶亂硬氣乾嘔大便或有或無不渴衆作驚治疑瞤故錢以史君子丸補脾石膏湯退熱次日又下之錢曰凡吐瀉五月內九分下一分補八月

內十分補勿下此脾虛瀉下之死錢留溫胃益脾藥  
止之李醫曰何食而哕錢曰脾虛不能食津少即哕  
逆曰何瀉青褐水錢曰腸胃至虛極冷故也錢治愈  
兒吐瀉當溫補余每用理中丸以溫其中五苓散導  
其逆五苓最治兒吐連數服蕙異攻散等溫藥調理徃徃便  
愈若虛損當速生胃氣宜附子理中丸并研金液丹  
末煎生薑米飲調灌多服效二三兩無害候胃氣生手足  
漸煖陰退陽回然猶癰癥即減金液丹一二分增青  
州白丸子一二分同研服漸減金液丹加白丸子蕙

異功散羌活膏濕白丸釣藤飲之類調理仍頻與粥  
雖至危者徃徃死中得生十救八九  
聖惠白朮散治冷熱不調吐利不止

白朮

木香

丁香

陳皮焙各一分

麥門冬

焙三分

粗羅一錢水中盪煎五分不時稍熱服

治吐利兼胃脘脹滿草豆蔻散

草豆蔻

皮去

木香

五味子

人參

白茯苓

陳皮

炒各一分

訶梨勒皮

甘草

炙各兩分

羅散一錢水小盞煎五分不時稍熱服量加

錢氏異攻散溫中和氣治吐瀉思食凡治兒虛冷病  
先與數服以正其氣

人參

茯苓

白朮炒

甘草炙

陳皮

等分末二錢水二盞薑五片棗二枚煎七分食前

溫服量與

張氏多白扁豆散飲調

玉露散一名甘露散

甘草

生一分

寒水石

嫩微青黑中有細紋

石膏

堅白各半

細末一字半錢一錢食後溫湯調下

治壯熱白餅子又名玉餅子

滑石

輕粉

半夏

天南星

二味

泡七次  
各一錢

巴豆

廿四粒淨水  
一升煮盡

末糯米飯丸如小棗豆捏作餅三歲上三五餅葱

白湯臨卧服量加

金液丹治兒吐瀉虛實極妙

治脾胃虛寒吐瀉等及冷痰

齊州半夏

一兩泥  
七次焙

陳米

咳嗽三錢水盞半薑十片煎八分食前溫熱服  
張渙勻胃散治三焦不調停寒膈上乳哺不消胃膈  
痞滿甚則喘逆吐利肌體痿黃

甘草

炙一錢

藿香

白豆蔻

人參

各一兩

木香

乾薑

炮

厚朴

薑炙

丁香

各半兩

細末一錢水小盞薑二片煎六分溫服

萬全人參散治脾胃氣虛止吐瀉

人參

白茯苓

白朮

乾葛



陳皮

白去

厚朴

薑炙

等分末半錢百沸湯點量服

惠眼沉香飲大治吐瀉

沉香

丁香

藿香

各半錢

肉豆蔻

二枚

檳榔

二個

甘草

炙一錢

末一錢水小盞老薑小指大槌同煎三兩沸溫服

劉氏人參異攻散治瀉痢止嘔逆順氣補虛

人參

錢半

白朮

兩半

青皮

陳皮

茯苓

甘草

各一分

豆蔻

三個入調子

末一錢陳米飲調秋八訶子或紫蘇木瓜煎五七  
沸早服兒傷寒以此正氣後以紅綿散寒門治  
醒脾散治吐瀉脾困

人參錢二

丁香粒升

白茯苓

白朮各一

藿香

甘草

各錢一

天南星

一個重七八錢  
去心入砂仁十

粒麪  
裹煨

細末一錢水六分薑三片冬瓜子十四粒煎三分

不時溫服

張氏六神丹定吐瀉

丁香

木香

肉豆蔻

炮麩

訶子肉

史君子

各一分

薑會

二分

細末薄麩糊丸如菴豆粥飲吞

治吐瀉紫雙丸

代赭石

陳皮

去白巴豆半錢同炒

木香

杏仁

各一錢

肉桂

去皮不見大

丁香

各半錢

藿香

二錢

細末粟米飯丸小菴豆大服七粒藿香湯吞吐瀉

藿香陳皮湯吐東湯

王氏治吐逆兼吐利不止

丁香

藿香

各一分

木香

錢一

硫黃

兩半

滑石

錢二

末錢半米飲調瀉附子一枚重半兩炮淨薑汁擣成餅白麪裹慢火煨熟將附切焙羅末或吐兼瀉入附末如藥三之一更因虛實米飲調下吐如激水者亦定吐利不止成慢驚或已成者兼金液丹趙氏白朮丸治吐瀉不止溫胃消食

白朮

木香

丁香

肉豆蔻

黃連

等分末麪糊丸如黃米米飲下十粒

吉氏治吐瀉不進食溫脾散

蒼朮

二錢油  
葱炒赤

陳皮

去白

肉桂

不見大

草果

各半錢

桔梗

甘草

各一錢

殭蚕

少許

末半錢棗湯調下

參苓散治吐瀉

人參

茯苓

山藥

乾葛

麥門冬

黑附子

炮淨

桔梗

甘草

炙各半兩

蓮子心

木香

不見火  
各一錢

藿香

各一

末一錢紫蘇米飲調下

朱氏大止吐瀉

鬱金一個刮去心入巴豆一粒麪裹煨末米泔汁調一字

李剛中治夏秋吐瀉

好黃連一兩炒深黃色冷入硝丹一兩炒丹焦為細末麪糊丸如芥子服二三十粒辟土生薑湯吞更量數服不妨

毛彬治胃氣不和吐瀉不止痰涎不食平胃引行諸

藥銀白散

半夏

一兩洗七次  
焙薑製餅

白扁豆

炒

鴛粟米

人參

白朮

焙

白茯苓

山藥

各四錢

細末二錢水八分薑二片棗一枚煎六分溫服

治脾胃虛弱乘冷吐瀉不定不問冷熱可服桃紅散

人參

藿香

麴紅色

等分細末半錢米飲調下不時量服

吐利津液少第七

聖惠治渴不止

筍穉

扁豆藤

各半兩

人參

一兩

細剉分六服每水小盞煎五分不時量分稍熱服  
張渙三和散治吐利津液燥少

白茯苓

一兩

烏梅肉

乾炒

乾木瓜

等分細末一錢水小盞煎五分溫時時服

治霍亂煩渴香豆散

藿香

肉豆蔻

各一兩

白扁豆

人參

各半兩

甘草

炙一兩

羅末一錢水八分盞薑二片煎四分溫服



丁時發人參散治虛熱及吐利煩渴踈轉後服

人參

茯苓

桔梗

乾葛

各半兩

生犀角

甘草

各一分

末一錢水中盞燈心煎五分煩渴入新竹葉量服

吐痢心腹痛第八

聖惠兒冷熱不調乳哺不節使陰陽清濁之氣相干而變亂腸胃間則成霍亂而心腹痛者冷氣與真氣相擊或上攻心下攻腹故痛  
外臺療霍亂心腹刺痛吐利

茯苓

桔梗

人參各六分

白朮五分

甘草炙

厚朴炙各四分

切水二升煮六合溫服

人參散治霍亂心腹痛不食

人參

白朮

芩薊

草豆蔻

厚朴炙薑

當歸炒

陳皮去白

丁香

桂心各一分

羅散不時薑棗米飲調半錢量服

治霍亂乳食不消腹心滿痛

訶梨勒皮

兩半

木香

當歸炒

白朮

霍香

陳皮

去白各一

細羅不時薑湯調半錢量服

肉豆蔻散治霍亂吐瀉腹痛

肉豆蔻

桂心

各一

人參

甘草

炙各半兩

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時量分服

冷吐第九

張渙溫脾散散寒濕治嘔吐

厚朴

薑炙一兩

丁香

白朮

乾薑

各半兩

肉桂一分

細末一錢人參湯調

衛生療胃氣虛冷痰吐嘔逆流星散

大半夏

生十枚 胡椒四十粒

粗末半錢水一盞生油七滴煎四分溫服

莊氏丁香丸治胃虛寒腹脹吐逆

丁香

木香

藿香

牛黃各半兩

腦麝

各一錢

膩粉

末麪糊丸小豆大熱湯化下一丸

相瀉治胃冷嘔吐肉豆蔻丸

肉豆蔻

麩裹煨  
半兩

丁香

末麩糊丸如芥子藿香柿蒂湯下三五丸渴飲湯  
丁時發治乳哺飲食溫冷過度傷于脾胃腹脅脹滿  
多吐痰涎

人參

丁香

半夏

洗七次

乾薑

各半兩

白朮

陳皮

各一分

粗末麩糊丸如麻子溫湯下十九

熱吐第十

聖惠麥門冬散治嘔吐不止心神煩熱

麥門冬焙

淡竹茹各半兩

甘草炙

人參

茅根

陳皮去白焙各一分

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分稍熱頻服量加

麥門冬散治嘔吐心胃煩熱

麥門冬焙

厚朴薑炙

人參各半兩

粗羅一錢水小盞薑少許煎一枚粟米五十粒煎

四分溫服量加

治嘔吐心煩熱蘆根粥

生蘆根

二兩

粟米

合一

水二大盞煎一半去滓投米作粥薑蜜少許食

張渙治胃虛挾熱嘔吐不止丁香益胃湯

丁香

人參

各一兩

訶皮

紅一兩

官桂

大黃

炮黑各半兩

細末一錢水小盞薑二片煎五分溫服

保命膏治吐逆不定服熱藥過多不差

川大戟

丁香

大黃

炮

不灰木

紅燒

甘遂

各一分

朱砂

雄黃

飛各半兩

粉霜

水銀

錫結砂各一錢

巴豆

淨十粒

黃蠟四兩銀石器溶膏旋丸如黍米周晬一粒十歲七粒新汲水下

挾驚吐第十一

張漢三番丹治挾驚嘔吐

藿香

丁香

各一兩

半夏

洗七次培半兩

膩粉

一分

龍腦

麝香

各一錢

薑汁麪糊丸如黍米參薄荷湯下十粒量加

殊聖歸命丹



小兒驚風吐還頻晝夜連連不輟停渌水槐黃  
泔淀汁和虫乳食一時噴

丁香

藿香

各一

生犀

牛黃

各半

猪鯽狗蝟熊膽

等分共半兩  
多此無妨

末丸如菰豆一歲下苦楝湯研二丸

治驚食胃管不快吐逆乳食或心胃發熱定吐丸

丁香

三七枚

蝎稍

四十條

半夏

三個洗

研煮棗肉丸如黍金銀湯吞七至十丸傷暑霍亂

吐瀉香茹散送

良方治久患翻胃兒驚吐諸吐田季散

好硫黃半兩水銀一升研如黑煤薑四兩汁酒一  
盞空心服三錢衣襪足指間汗出逆運遍身如膠  
腥穢難近差驗此極難調先澆水指緩研增湯令  
和否則浮泛不可服

王氏睡驚丸治熱化痰鎮心神治驚悸吐逆

半夏

薑製

乳香

犀角

等分末薑汁糊丸如菴豆薄芎臨卧服七至十粒

毒氣吐第十二

巢氏春夏以湯與兒腸胃脆弱不勝藥勢遂吐下不止藥熏藏府煩懊頓乏為中毒氣吐下

千金藿香湯治毒氣吐下腹脹逆害乳哺

藿香

一兩

薑

三兩

青竹茹

甘草

炙各半兩

哎咀水二升煮八合服一合日三熱加升麻半兩

王氏消妳毒令兒吃乳無毒有毒亦解

升麻

半兩

大麻子

破一兩

酒浸辰與妳子喫一錢臨乳捏去此

幼幼新書卷二十七 遍閱山樓刻

方瑞先刻

幼幼新書卷第二十八

泄瀉羸腫 凡十五門

後學古吳陳履端于始輯

爛溪周應憲公章校

一切泄瀉第一

養生轉圜瀉者古皆謂利尋常水瀉謂利米穀不化

為米穀利或言下利清穀

清冷也

痢謂滯下言所下濡

滯

膿血點滯坐圜遲久

痢有四寒熱疳蠱是也

白多為寒赤多為熱兼以後重

赤白相雜為疳蠱則純血

隨證用藥不若今人之妄

茅先生霍亂吐瀉積瀉驚瀉疳瀉渴瀉傷瀉冷瀉熱

瀉形狀別而用藥殊如調一瀉證變眼視口瘡臍口  
乾燥瀉久不止并下黑血顙門腫陷不能進食大渴  
死兼看三關脉微微青黑腫起亦死

錢乙黃承務子二歲病瀉衆止之十餘日其證便青

白乳不消身涼加硬氣昏睡衆謂病篤錢以益脾散

三服

胃氣不和門

補肺散三服

喘嗽上氣門

三日身溫而不硬

氣後以白餅子微下

吐利門

與益脾散二服利止蓋利

本脾虛傷食十日不止上實下虛脾氣弱引肺亦虛  
且便青為下藏冷下必大虛故補脾肺即身溫不硬

氣病退而後下所傷食何至虛耶

驚風或泄瀉等諸病煩渴者皆津液內耗不問陰陽  
宜儘飲錢氏白朮散彌多彌好  
和胃氣不

寶鑑乳母有孕氣血不榮于乳飲子則髮立腹急時  
瀉胃背皆熱夜啼肌瘦一如積聚

兒飲水時被驚或啼未住而飲水成水痢癖

茅先生諸瀉死候歌

大瀉應難止渾身熱困多緩睛澹泄滑顙陷見  
奔波

養生治大小老虛之人不拘冷熱泄瀉

黃連

白芍藥

並劉如豆

吳茱萸

等分釜內慢火炒赤杵羅服三錢七水盞半煎八分空腹食前溫服日三四兒量與或以水浸蒸餅丸如桐子或萊豆黃米大兒十五至二十九溫米飲下作散沸湯或溫米飲調亦治泄瀉忌生冷魚

肉肥膩

一方有木香無芍藥醋糊丸

治老虛人下利滑泄

赤石脂

乾薑

等分麪糊丸如桐子空腹溫米飲下廿丸知為度  
兒小丸赤石脂河東陝西有真齊州出者廼桃花  
石

茅先生香連丸治瀉利

木香

黃連菜黃半兩同炒煙起

肉豆蔻

訶子

炮去核各半兩阿膠麪炒

朱砂各一錢

末軟餅丸如米餅飲吞十九十四丸兒小碎之

乳香散治一切瀉痢

乳香

二錢荷葉干炭火上炙半鎔

肉豆蔻



白薑

甘草炙

草果子各一

細剉醋麪裹熱灰煨赤為末入乳香服半錢一錢  
陳米飲調

嬰孺治老小一切利及成疳者

白龍骨

白石脂各五

雞糞炒

黃連

胡粉炒

茯苓

阿膠炙各

末蜜丸桐子大米飲下十五至廿九日二意裁

增減水藥皇子湯注下三四日服

龍骨

牡蠣煨各

人參

乾薑

甘草 炙

赤石脂 各三 細辛

附 炮各

黃連 五

水四升煮升半為三服日三兒量

張渙丁香黃耆散治脾胃虛弱不食漸損榮衛肌體  
羸瘦時下利面青白

綿黃耆

丁香

當歸 焙

白朮

鼈甲 酥炙

人參 各一

胡黃連

甘草 炙各

末一錢水一盞薑二片棗二枚煎五分食前溫服

人參散治胃氣虛弱泄瀉不止

人參

白茯苓

枇杷葉

甘草

炙各半兩

丁香

一分

肉豆蔻

二個

藿香

厚朴

薑製各一

兩

青皮

當歸

乾薑

炮各一分

末半錢水半盞薑一片煎三分溫服

患眼溪螺散治瀉

船底下溪螺

四十九個水浸出泥

乾葛粉

半兩

葛粉摻螺上碗盛薑蓋一宿取螺上粉曬服一錢

退猪湯調

張氏肉豆蔻散理瀉痢

肉豆蔻

大訶子肉

青皮

附皮炮去

厚朴

薑製炒熟  
各半兩

末大小加減空心粥調

莊氏治風冷入腸胃腹疼泄瀉虛風胃風湯

人參

官桂去

白朮

芎

天麻

大附子

炮裂  
淨

等分末二錢水一盞入粟米煎七分溫服

治脾癖乾瀉散

黑三稜去

神麴炒

鼈甲生

蓬莪朮

陳皮

蝸牛殼

自乾死者

等分細末半錢米飲調不時服

孔氏茯苓丸治久新瀉痢不問冷熱分利水道

白茯苓

五

黃連

兩一

阿膠

炒三

未燒粟飯丸如菰豆米飲下廿丸

吳婆散治疳熱冷瀉腹虛脹肉瘦骨存瀉利不止

宣連

白茯苓

阿膠

炙

人參

黃蘗

蜜炙

丁香

各一

訶梨勒皮

煨二

桃白皮仁

沒石子

緊實者一枚

細散一二字不時白米泔調

王氏白朮散和中益胃散風濕治腸鳴泄瀉米穀不  
化利下青白腹痛嘔逆脅肋脹滿氣痞不散體熱多  
睡全不思食

芍藥

當歸

官桂

人參

白朮

茯苓

粟米

炒一

粗末一錢水六分煎三分溫服

溫胃固腸丸

肉豆蔻

縮砂仁

丁香

龍骨

呵子皮炙 赤石脂

等分白麩糊丸如菜豆服一二十九飯飲下量兒

治歲冷滑泄不止腸鳴腹痛以聖丸

青州棗廿五個黃丹二錢肉豆蔻一個 訶子皮

草豆蔻麵裹燒各半兩 木香一分

末醋糊丸如小黃米米飲下廿丸

吉氏銀白散治脾胃氣弱泄瀉不食

人參 茯苓 甘草炙 藿香

白扁豆炒微生 白朮炒麩

等分末服半錢紫蘇餅飲下量加

朱氏木香散治脾胃不和瀉痢

木香

白木

各一

藿香

益智

各半兩

肉豆蔻

煨三個

末半錢或一字量兒木瓜紫蘇湯調

相瀉桑葉散治泄瀉虛滑頻數不止

人參

白茯苓

藿香

乾薑

焙

等分末半錢桑葉湯調大人瀉一錢

丁時發開胃丸治乳食不消冷熱不調泄瀉頻併進



飲食止吐逆

木香

白朮

人參

當歸

各一分

肉豆蔻

錢半

細末麪糊丸如粟麝香溫米飲下一二十九

積瀉第二

夾實瀉并積利附

茅先生兒積瀉面青黃眼微黃上渴肚臃嘔逆遍身

潮熱通下臭穢因食多傷脾先用青金丹下積積聚

勻氣散

胃氣不和門

醒脾散

一胃氣不和門一慢脾風門

香連丸

泄瀉

門相夾調理

形證論冷瀉有積歌

積傷冷瀉有多般四體平和無熱看瀉終不定  
休言止取積為先順氣安

冷食在脾身溫無事阜角膏取調胃散並積熱門

嬰孺治發熱腹內不調時下利不消顏色漸黃

厚朴

黃連

各三

人參

龍骨

各四

切水升八合煮升二合今溫至夜眠漸盡乳母忌  
油膩果子生冷

治八歲上熱結痰實不能食自利

大黃分十三

柴胡分九

升麻

黃芩

枳實分六

竹葉切升半

梔子仁

芍藥分各八

細辛分二

知母

薑三分一無此有杏仁

水升八合煮升二合分溫至夜漸服盡乳母忌油

膩果子生冷

大黃散治十二三歲結熱痰多壯熱食少結者自下

大黃分十二

柴胡

枳殼

升麻

芍藥

梔子仁各十分

竹葉升一

薑分三

知母

杏仁淨各八分

水六升煮二升為四服十歲外為三服兒小量之

大黃湯治結實壯熱頭痛

大黃

柴胡

甘草炙

薑各十分

升麻

知母

黃芩各七分

大青五分

石膏十分

芍藥

枳實各六分

水四升七合煮升三合為四服量加

吉氏芍藥散治積痢

芍藥

枳殼炒

甘草

地榆各一錢

黃蘗半兩

川烏頭炮一個

焙末半錢白楊湯下

驚瀉第三

茅先生兒面青眼微青身微熱瀉青紅水或如草汁

因先驚積後喫冷物衝發為驚瀉用活脾散一胃氣不和門

一慢脾風門鎮心丸一驚門夾香散一瀉門泄一泄勻氣散一胃氣不和門

調理

石壁經歌

瀉出還如藍靛青目光緊急黑添睛只看眼凸

胞青脉鳳髓只看眉便是驚傷冷瀉因

冷傷藏府次被驚致目睛青色轉甚眼白亦青目  
睛與白睛高甚唇白亦青精神不足勿怕先溫脾  
次去驚亦分水穀

治驚瀉大餅子

大附子

破炮淨  
二片

韶粉

附子  
大

藿香麝

丁香

五十  
粒

末滴水為餅如棋子飯飲化

傷瀉第四

茅先生兒肚臃脹硬身微熱微嘔因父母愛子將粘

滑物與喫兒食噎着五藏停在胃膈不消慕瀉下為

傷瀉醒脾散

一胃氣不和門  
一慢脾風門

勻氣散調二日

和胃氣不

瀉漸疎用青金丹下所傷物

積聚門

再進勻氣建脾散

胃氣不和門

千金大黃湯治下痢苦熱不食傷飽不乳

大黃

甘草

麥門冬

各一兩

呔咀水二升煮一升二三歲分三四服

生金牛黃湯主積下不止發癰

生金

三銖或六銖用屑  
熱金成器者俱可

牛黃

三銖

細辛

半分

麻黃仁

乾薑

有熱生薑代

人參

黃連

甘草

炙各一分

呔咀水升六合煮八合臨卧研牛黃湯中

醫局開胃丸治藏府怯弱內受風冷腹脅脹滿腸鳴泄瀉或青或白乳食不化又治藏冷夜啼胎寒腹痛

木香

蓬莪朮

白朮

人參

當歸

炒各半兩

麝

芍藥

各一分

羅炊餅丸如黍溫米飲下十五新生兒腹痛夜啼

乳前服五丸



冷瀉第五

茅先生兒腹虛鳴身微熱腹脹滿為冷瀉因冷食傷

宜乳香散

瀉門一切泄

調中飲

胃氣不和門

寶鑑兒冷瀉為脾虛胃冷不消五穀糞不結實腹脹瀉氣酸乃有積

顛顛治水瀉痢并脾冷食乳不消喫乳頻吐溫脾散

附子

乾薑

甘草

各半兩

白朮

兩

末空心米飲調半錢忌鮮魚毒物

千金溫中湯治夏月積冷洗浴過度及乳母亦冷浴

兒飲冷乳壯熱忽值暴兩兒瀉如水胃虛弱則面青  
肉冷眼陷乾嘔先調胃瀉止

乾薑

厚朴薑製各一分

當歸

桂心

各三分

茯苓

人參

白朮

桔梗

各二分

呔咀水二升煮九合百日内服二合半更裁

張漢兒夏傷濕冷入腸胃泄瀉不止川楸丸

川楸

淨慢火炒一兩

肉豆蔻兩半

末粳米飯丸如黍米飲下十粒量加

治泄注不止手足逆冷助胃丹

附子

一枚重半兩炮淨

舶上硫黃

乾薑炮

肉豆蔻

肉桂

白朮

炮各半兩

末白麪糊丸如黍食前米飲下十九

粟煎湯治腸胃受風冷泄注身熱

白朮

炮

當歸

洗

川芎

人參

肉桂

芍藥

各一兩

末一錢水小盞薑三片粟米一匙煎五分溫服

孔氏治藏府不調大便青色

白朮

人參

茯苓

各一錢

甘草

炙半錢

末一錢水小盞煎七分溫服

熱瀉第六

茅先生兒渾身微熱上渴驀地瀉如水為熱瀉因當風日或日下去被曬五藏受虛熱毒忽然喫水過多致不消化乳香散夾三聖丸一錢切泄瀉門龍涎膏與服熱瀉

嬰孺治三歲兒熱實不脹滿下不止

麥門冬

一兩

大黃

五分

甘草

三分

當歸

柴胡

人參

黃芩

各四分

水三升煮升二合為三服大利止

張漢清胃散治挾熱瀉痢

川楝子

黃蘗

炙

當歸

洗焙

地榆

炙

黃連

炒各半兩

末一錢水八分煎四分乳前溫服

劉氏木香黃連等分末陳米飴丸棗豆大米飲下三

五丸

洞泄第七

巢氏春傷于風夏為洞泄兒春時解脫風冷傷肌肉  
至夏飲食起居不調又被風冷入膈胃先後重沓為  
邪所乘則下利冷氣盛為洞泄不止為注下又不止  
多變驚癇亦變眼痛生障下焦痺冷結熱上焦熱重  
肝故也

聖惠厚朴散治脾胃不和洞泄下利羸瘦食少

厚朴

薑炙

人參

訶皮

煨

白朮

黃連

炒

地榆

炙各一分

甘草

炙

乾薑

炮各半

肉豆蔻

一枚

羅散粥飲調半錢日三四量加

張渙厚朴散治洞泄注下

厚朴薑製

訶皮炮

肉豆蔻

各一兩

白朮

乾薑

炮各半兩

羅一錢水八分薑粟米各少許煎五分溫服

萬全龍骨丸治冷熱不調時洞泄

龍骨

黃連

白石脂

白礬

燒

乾薑

木香

各半兩

末醋糊丸如麻子粥飲下五九日四更量

劉氏兒水瀉下注

黃連

石蓮

等分末半錢水瀉新汲水調白瀉粟米飲下

水穀瀉第八

聖惠寒溫失宜乳哺不節或當風解脫血氣俱虛為風冷所傷留連肌肉因脾胃不和大腸虛弱風邪入腸胃腸胃既虛不能制水穀故下利

千金治暴冷下水穀或乳冷下青結不消或冷實吐下乾嘔煩悶及冷滯赤白下者良若已服利藥實去



胃中虛冷下如水乾嘔眼陷煩擾除大黃若乳母洗  
浴水氣未消飲兒為霍亂勿去大黃兒諸霍亂宜利  
者用之不消利宜溫中者除之

溫中大黃丸

大黃

六分

乾薑

炮

桂心

厚朴

製

甘草

炙各一分

當歸

人參

茯苓

白朮

炮各二分

桔梗

呔咀水二升半煮八合兩月內服二合量加

治卒大下利熱唇乾口燥嘔逆引飲瀉心湯

人參

甘草炙

黃苓

陳皮

苦蕒根

各一兩

黃連

二兩

半夏

洗淨三兩

乾薑

炮兩

呖咀水六升煮二升分三服胡洽治老少利水穀

腹鳴心下痞乾嘔無橘皮苦蕒寒加附渴加苦蕒

嘔加橘皮痛加當歸仲景大棗十二枚

聖惠厚朴散治水穀利羸瘦面黃不食

厚朴

炙

龍骨

黃連

炒各半

白丁香

當歸

炒

白朮

肉豆蔻

各一兩

木香

羅翬飲調半錢日三四量服

地榆散治水穀日夜無度

地榆

厚朴

薑炙各三分

黃連

淨炒一兩

阿膠

半兩

羅散不時粥飲調半錢量加

醫局胃風湯治風冷棄虛客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脅滿腸鳴疴痛及腸胃濕毒下如豆汁如瘀血日夜無度

人參

白茯苓

芎

桂皮

當歸

白芍藥

白朮

等分粗散二錢水大盞粟米百粒煎七分空心稍

熱服量兒

暴瀉第九

亦名卒利  
亦名暴利

巢氏腸胃虛暴冷熱氣傷之為卒利熱則色黃赤冷則色青白冷熱相交變為赤白滯利

聖惠胡黃連散治冷熱氣不和忽暴下利腹內疼痛

胡黃連

母丁香

桂心

木香

肉豆蔻

當歸炒

麝香各一分

犀角半斤

細羅粥飲調半錢日三四意裁

龍骨散治暴利

龍骨

黃連

炒各一兩

枳殼

炒

當歸

各半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時量與

張漢阿膠丹治泄利身熱及暴瀉注下

阿膠

炙

乾薑

各一兩

芍藥

當歸

焙

川黃連

肉豆蔻

各半兩

羅末蜜丸如黍米飲下十粒量加

補一切虛不熱男女小兒皆可服冷積暴瀉神仙玉

粉丹

精明船上硫黃

一片去沙石盡打碎

獾猪肚七個旋取桑根白皮三斤寸剉猪肚一個  
洗淨內硫黃線縫水二斗將桑皮一斤煮一伏時  
餘肚慢火養勿令冷煮滿一伏時別換猪肚桑皮  
同煮一伏時又換猪肚桑皮過三伏時不換桑皮  
只換猪肚水耗添熱湯候滿七伏時已完七肚溫  
水淘淨研細烈日曬極熱再研煮糯米粉丸如梧  
子空心米飲下十粒至十五丸大率驅除宿冷其  
效無以老人經久可服

曩瀉第十

亦名  
曩利

聖惠秋夏晨朝多中暴冷之氣折其四肢則熱不得泄入腹變利或赤白小腹脹痛肌體壯熱脉洪大急數皆由冷熱氣相併連滯不差為暴利外臺

甘草

茯苓

各六分

人參

黃連

各四分

厚朴

炙

薑

各二分

龍骨

八分

切水一升煎三合欲卧先取鹽麩麝為小丸肉下部中服藥忌如常法

藥多水少宜少增水

利久不止第十一

瀉利同

巢氏春傷于風夏為洞泄兒春時解脫風傷肌肉夏  
因水穀利久不差腸胃虛易為冷熱冷變白膿熱則  
變血冷熱相加赤白相雜久則腫滿亦變病重亦令  
嘔噦

鳳髓經滑腸瀉歌

宜冷熱利門香連丸下利腹  
痛門紫霜丸並與吉氏同

脾中有積熱遲留至使終年瀉不休項軟見人  
多硬氣更兼清水臍中流少間有似黃金色若  
有垂腸更不收形證又看胃膈上胃前深赤汗  
如油唇赤生瘡眼脉赤若不調脾命即休



千金七味散治利久不差

黃連八分

龍骨

赤石脂

厚朴

烏梅肉各二

分

甘草

炙一分

阿膠

炙三分

篩水服二寸七日二兒一錢七

華陀治老小下利漿立不食入口即出命在旦夕

黃連

亂髮灰

醇苦酒

蜜

各半雞子殼

白蠟

方寸七

雞子黃

一枚

銅器盛酒蜜蠟雞黃置炭火攪勻內黃連髮灰攪

煎可丸即丸一日夜盡

外臺療久痢無問冷熱疴痢悉主

棗一枚去核勿破皮內滿胡粉燒研米飲和服一  
歲下分服三服差驗

聖惠治久利赤白漸羸胃虛不食丁香散

丁香

厚朴

炒薑

黃連

炒

當歸

炒

訶梨勒

煨

白朮

炒

伏龍肝

各半

木香

一

赤石脂

一兩

搗散粥飲調半錢日三四更量

聖惠黃連丸治暴利經久不斷增減有時

黃連炒

人參

赤石脂

龍骨

甘草炙

黃芩

厚朴薑炙

白茯苓

枳殼

麩炒淨  
各半兩

烏梅肉

炒一

羅散蜜丸如麻子粥飲下七九日三四量加

譚氏斗門散

小兒瀉利甚青黃久患時多轉滑腸下部脫肛

頻努嚙朝朝焦瘦漸羸疳

呵子

枳殼

地榆

等分末一錢米飲調一歲下半錢

嬰孺龍骨湯治下利不住

龍骨

甘草炙

黃連各四分

當歸

乾薑

各一分

水四升煮升二合食前溫分三服

龍骨湯治服藥下後不止

龍骨

五分

甘草炙

乾薑

當歸

黃連

赤石脂

附炮淨

前胡各三分

水四升煮升二合為六服旦至午盡

黃連煎治冷熱利經時不止體羸不堪餘治差而又

發

好黃連二兩水七升蜜八合煎升三合百日兒服  
半合量加

治下痢久不斷羸瘦脾胃冷弱食不化雞骨丸

宿雌雞胸肋骨一具

黃連六分 厚朴三

麴炒 甘草炙

白朮各四分 麥蘖黃炒

烏莓肉各二分 人參 赤石脂 黃芩

白龍骨各五分 桔梗二分

末蜜丸小豆大白飲下廿五丸日二量與

漢東王先生治久瀉脾虛不食食即瀉米穀不化溫  
白丸

白朮

米泔浸炒一分

丁香

炒半

半夏

泡七次錢半

末薑汁糊丸如菴豆半歲三九三五歲五七九淡

薑湯吞早晚各一服

治久瀉脾困不思乳食恐作脾風惺惺散

天麻

全蝎

炒各半錢

木香

糯米

人參

茯苓

並微炒

白扁豆

炒

山藥

焙

甘草

炙各一錢

末嬰孺一字二三歲半錢水半銀盞棗半片煎十數沸服

治久瀉脾虛發搐變慢驚慢脾等竹瀝膏

白朮蜜炒一錢

大附淨泡一錢

全蝎七個各用薄荷各七葉裝湯泡麻黃經

炙黃

犀角一錢

厚朴甘草水煨一錢

末竹瀝為膏旋丸嬰孩黑豆許二三歲阜子大四五龍眼核大薄苛湯化量加

張渙治瀉利久不差香礬丹

木香

白礬枯各一兩

訶梨勒炮

酸石榴皮

炒黑各  
半兩

羅末蜜丸如黍粥飲下十粒量服

劉氏

人參

白朮

茯苓

甘草

陳皮

藿香

丁香

木香

肉豆蔻

等分末二錢藿香合糯米煮粥飲調服

吉氏治久瀉不食丁香散

丁香

肉豆蔻

陳紫蘇

陳皮



鹽木瓜

等分末半錢米飲調下

丁時發治冷熱作瀉熱藥不止

槐花

石榴皮

地榆

黃連

呵子

等分末冷水調半錢

莊氏秋深冷痢不止灸臍下二寸三寸間動脈中三壯

利渴不止第十二

瀉利同

葉氏水穀利津液枯竭府藏虛燥則引飲小便快者  
利止渴亦止小便澀水不行于小腸滲入腸胃渴亦  
不止利不斷此脾弱不能克水身亦浮腫上焦本熱  
又利下焦虛上焦熱氣轉盛薰肝眼必痛而生障  
外臺麥門冬湯治夏月藥大下後胃中虛熱渴

麥門冬

甘草

炙各四分

枳實

炙

黃芩

人參

各三分

龍骨

六分

切水二升煮九合分溫服

聖惠黃耆散治利渴心胃煩悶不欲食

黃耆

麥門冬焙

黃芩各三分

龍骨一兩

烏梅肉

炒三枚

白朮

黃連

炒各半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時溫量服

黃芩散治利渴不止

黃芩

訶梨勒皮

煨

檮杌皮

各半兩

苦蕒根

黃連

當歸

炙各三分

烏梅肉

炒一分

羅散一錢水一瓊煎五分不時溫量服

當歸散治利渴腹痛不止

當歸

炒

黃連

黃耆

各三分

乾薑

炮

甘草

炙各半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時量溫服

龍骨散治利渴體熱煩悶

白龍骨

兩一

胡黃連

兩半

茯神

人參

茅根

麥門冬

焙各三分

粗散一錢水小盞煎五分不時溫量服

嬰孺子芩湯治大熱利兼渴增寒

子芩

枳殼

炒

黃蘗

各四分

石膏

十二分

竹葉

一升

檳皮

十分

人參

七分

水五升煮升六合七歲兒三服量與

冬瓜湯治渴利不住

冬瓜

合八

苦蕒

分十二

茯苓

知母

各八分

麥門冬

分五

粟米

半二合

水五升煮升四合新布絞量與

寶鑑竹茹丸

好黃連

一兩判塊柴蕒一兩  
清蜜少許炒黃赤

末薄糊丸蘿蔔子大竹茹煎飭飲吞十九

王氏人參白扁豆散治脾胃不和不思飲食吐瀉渴

兒虛熱煩躁

人參

白扁豆

炒熟去皮

白朮

茯苓

各一兩

鴛粟子

甘草

炙

山藥

各半兩

末二錢水中瑣薑二片棗半個煎七分通口服如  
腹疼加紫蘇兒虛熱加薄荷

下利腹痛第十三

瀉利同

聖惠黃連散治久赤白利不止腹痛羸弱不食

黃連

炒淨一兩

厚朴

薑炙

乾薑

木香

艾葉

炒

龍骨

各半兩

當歸

炒

黃牛角腮

灰各  
三分

烏梅肉炒一

細散粥飲調半錢日三四量與

黃蘗丸治久赤白利腹脹疔痛

黃蘗炙

當歸炒各一兩

末煨大蒜丸如棗豆粥飲下七九日三四量與

木香散治久赤白利腹脅疼痛

木香

訶皮煨

臭櫟皮炙

木賊

黃連炒各半兩

羅粥飲調半錢日三四量加

肉豆蔻散治久赤白利腹疔痛全不思食漸羸

肉豆蔻三枚

青皮焙去白

黃牛角鯁炙當歸

地榆

厚朴炙

黃連炒各半兩

乾薑炮一分

羅粥飲調半錢日三四量加

下利羸瘦第十四瀉利同

巢氏腸胃虛弱受風冷

聖惠作扶疳氣

則下利利斷後脾胃

尚虛穀氣猶少不能榮血氣故羸瘦

聖惠桔梗丸治利久不斷肌羸食不消

桔梗

神麴炒各一兩

麥蘖

烏梅肉炒



厚朴炙薑

白朮

人參

赤石脂

黃芩

龍骨

桂心

甘草炙各半兩

黃連

炒兩半

黃雌雞骨

一具酒浸一宿炙黃

末蜜丸如棗豆粥飲下五九日三量加

雄黃散治久利不差羸瘦壯熱毛焦不食

雄黃

蘆會

青黛

朱砂

熊膽

麝

龍膽

黃連

黃蘗炙

當歸炒

白芷

細辛

甘草

炙各一兩

蚱蜢淨七枚

乾蝦蟇酥炙一兩

細羅井華水調半錢日三四量加

治下利不止瘦弱雞子粥

糯米一合粥臨熟破雞子一枚攪入少醋空腹食

下利浮腫第十五

瀉利同

惠濟論兒利差後遍身腫歌

宜塌氣散

冷利日久失醫治遍身浮腫却如吹脉洪是氣  
化為水沉實還因積有之氣順腫消為上法氣  
平兩日定多尿莫交食飽還憂滯此疾元因積

損脾

幼幼新書 卷二十八  
塌氣散

茴香

白牽牛

甘草炒

木香錢各一

末半錢紫蘇湯下

王氏止渴聖效散治吐利氣虛津液減耗生疳煩渴  
飲水不休面腫脚浮腹大頭細小便利白全不喫食

乾葛

白芷

黃丹生炒各半

細墨各二兩

細末半錢倒流水調下